

心臓CT 治療計画表(入院用)








患者 _____ 殿

医師 _____

画像診断技師 _____

看護師 _____

パス開始日 _____ / _____

日付	検査当日(/)		
	病棟	CT室	病棟
到達目標	検査内容が理解でき、検査が問題なく終了する。		
準備	身長と体重を確認します。 車椅子で検査室に行きます。 病衣に着替えていただきます。 	体を固定します。 両上肢は頭側にあげて固定します。 心電図をつけます。 息止めの練習をします。 	
点滴	点滴をします。 	造影剤を点滴から注入します。	検査後は、脈が通常まで戻るのを待って点滴を抜きます。
内服	脈拍が速ければ、必要に応じて脈を遅くする薬を内服します。 (薬の名前:セロケン)	必要に応じて血管をひろげる薬を 口の中に噴霧します。 (薬の名前:ニトロスプレー)	
	脈を整える薬を服用した場合は、通常の脈に戻るまで1~2時間ほど経過を見る場合があります。薬の効果は一般的には半日ほどあります。めまい・ふらつき・注意力の低下があることがあります。当日の車の運転、危険を伴う機械の操作、高所での作業には十分注意してください。 		
検査	脈拍と血圧を測定します。 薬を内服した場合は、脈拍が1分間に60回以下になるまで何回か測定します。		血圧を測定します。 
食事	特に制限はありません。 		
その他	検査説明用紙を事前に読んでおいてください。 気分が悪くなったり、頭痛、めまいが起こる場合は看護師にお知らせください。	気分が悪くなったり、かゆみや息苦しさを感じた場合は看護師にお知らせください。 	お問い合わせ先 近森病院 画像診断部 Tel088-822-5231