

乳房切除術＋センチネルリンパ節生検 治療計画表

患者氏名 殿

医師

薬剤師

理学療法士

看護師

管理栄養士

作業療法士

パス開始日

日付	外来	前日	手術日		術後1日目	術後2～3日	術後4～6日	術後7日
		/	手術前	手術後	/	/ ～ /	/ ～ /	/
達成目標	術式を理解し、術後の流れや合併症の対応方法を確認できる	手術を受けられるように体調を整える 手術後のリハビリを理解する	リラックスして安全に手術が受けられる	痛みがなく安楽に過ごすことができる	尿管を抜いて歩行ができる リハビリを始める事ができる	リハビリのパンフレットに沿ってリハビリができる ドレーンが抜去でき退院ができる		
点滴		午前中にセンチネルリンパ節生検の準備のための注射があります 午後、撮影に行きます （時間は当日の状況で前後します）		手術中から点滴をします 	朝食を半分程度食べられれば、点滴を抜きます			
内服	普段の薬を確認します 	手術に支障がなければ、 普段の薬を内服していただきます 眠れない方は睡眠剤を飲みます 便が出にくい方は下剤を飲みます		痛みや吐き気があれば、座薬や点滴で 痛み止め・吐き気止めをします 内服できるようになれば痛み止めを飲んで いただきます	普段の薬を飲みます 術後4日目まで痛み止めを飲みます 痛みが続く場合には頓服で痛み止めを飲みます 			
処置		手術側の腋毛を短くカットします	時分に手術室に向かいます 連絡待ちの方は分かり次第お伝えします 手術室に入る30分から1時間前に 手術衣に着替えます 手術部位に印を付けます 弾性ストッキングを着用します （術後歩行できるようになるまで着用）	酸素マスクや心電図モニターを付けます （手術終了後～3時間） 腋の下にチューブが1本入っています	チューブ（ドレーン）を引っ張ったり、引っかけたりしないように注意して下さい ガーゼ交換や消毒は必要ありません	術後6日目までにチューブを抜きます	チューブ抜去後に浸出液が体外に出てくることがあります →ガーゼを当てますので看護師を呼んでください その後皮下にたまる場合があります（穿刺の処置が必要になります）	
検査	血液検査、心電図、画像撮影、 肺機能検査などの検査を行います 	身体計測・血圧測定 手術する腕の挙上計測をします				術後4日目から上肢挙上を測定します（術前の10cm以内が目標）		
検温		1回測ります 		帰室後、30分後、1時間後、 2時間後、3時間後に測ります 	2回測ります 	1回測ります 		
安静度		病院内で自由にしてください 麻酔の説明を受けるまで、病棟外に行くときはナースステーションで行き先を伝えてください		病室に帰ってきてから3時間後、看護師の見守りのもと歩行することができます （歩行できれば病棟内の移動は制限ありません）	動くときは、腋の下のチューブに気をつけてください			
清潔		手術前日は除毛後に シャワー浴してください 			看護師が全身シャワー浴のお手伝いをします 洗髪もできます 防水テープで保護されているので、創部に多少水がかかっても問題ありません	チューブが抜けたら、自分でシャワー浴ができます 主治医の許可があれば入浴もできます 		
排泄			手術室搬入時間の30分前には トイレを済ませてください 午後からの手術で連絡待ちの方は ナースが声をおかけします	手術中に尿管がはいります	歩行できれば尿管は抜きます トイレに行きたくなったら最初は看護師を呼んでください 			
食事		前日の夕食まで 普通に食べられます 	朝から絶食です （水分は麻酔科医師の指示まで飲めます）	病室に帰ってきてから3時間後、看護師付き添いで水分を取ります ムセ込まなければ、少量の食事ができます 術後当日の夕食は準備しておりません 必要であれば、家族に準備してもらうよう依頼してください 多く摂取すると吐き気を催す事があるので、少量の摂取に止めてください	朝から食事が始まります 			
リハビリ					リハビリは手術前にお渡ししたパンフレットを参照しながら実施して下さい リハビリは看護師、理学療法士などと一緒に 行います 肩関節を90度以上挙げることはできませんが、手を握ったり肘を曲げることからリハビリを開始します	術後4日目から腕を上 to 挙げる訓練を開始する予定です		
その他	手術の必要物品を準備してください （胸帯ブラジャーの試着） 看護師から入院中の生活と 手術前後の経過についてお話しします リハビリ、リンパ浮腫についての パンフレットをお渡しします 「手術を受けられる方へ」も読んでください	8:30にはご来院ください 手術に関する同意書を病棟に 預けていただきます 麻酔医より麻酔の説明があり、 同意書を書いていただきます	ご家族は（ ）時までにお越しください 手術に行く前は身につけている貴金属を 外しておいてください （めがね、指輪、ピアス、義歯、マニキュアなど）	手術終了直後、医師より家族に手術の 結果について説明があります 圧迫帯を術後1～2日間装着します 下着は圧迫帯除去後から使用しますので 圧迫帯使用時の下着は装着不要です		圧迫帯を除去 します	乳房再建術を受けた患者さんのリハビリは、 形成外科の指示で決まります 詳細はその都度後説明します 補整下着についての説明をします 乳房切除後補整製品のパンフレットを紹介します	手術で摘出した標本の病理結果説明は退 院後になります 看護師・医師から退院後の生活について 説明があります 次回来院の日時についてご確認ください 退院にあたって心配なことがあればご相 談ください